

Testiranje zrelosti jabolk in ocena obiralnega okna po regijah v Sloveniji 2026

Datum vzorčenja: 5 in 6.10.2026

Datum analize na Pimprenelle: 6.10.2026

Sorta: različne sorte

Preglednica: povprečne vrednosti testiranj dozorevanja plodov sort jablane po posameznih regijah v Sloveniji

Datum	Regija	Tip nasada (namakano/nena makano, mlad/star)	SORTA	Vzorčno mesto	Povprečna teža ploda (g)	Topna suha snov (Brix)	Trdota (kg/cm2)	Skupne kisline (g/L)	Škrobna vrednost (1-10)	Streifov index	Opombe	Začetek obiranja (datum), obiralno okno
	Podravje	mlad/namakan	Topaz	Gačnik	166	12,7	7,4	5,9	9,0	0,06	G41	07.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Topaz	Gačnik	172	13,2	7,4	7,5	7,9	0,07		07.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Topaz	Gačnik	167	13,7	7,4	6,5	8,5	0,06	M9 -posredovalka	7.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Rubelit	Gačnik	200	13,4	7,9	6,3	8,0	0,07		08.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Fuji Fubrax	Gačnik	194	14,2	8,3	3,8	6,9	0,08		09.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Fujion	Gačnik	213	14,7	8,6	3,8	5,8	0,10		9. ali 12.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Fengapi Tessa	Gačnik	187	14,2	9,2	4,3	7,3	0,09	M9	09.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Fengapi Tessa	Gačnik	162	13,6	8,8	3,2	8,7	0,07	G 11	08.10.2026
	Podravje	star/namakan	Braeburn Maririre	Gačnik	190	11	8,9	5,1	4,5	0,18	Gala x Pink Rose	12.10.2026
	Podravje	mlad/namakan	Inored Story	Gačnik	189	13,5	9,2	6,3	4,6	0,15		12.10.2026
	Podravje	star/namakan	Fuji Kiku	Gačnik	209	13,3	7,9	3,5	6,2	0,10		12.10.2026
	Primorska		Karneval	Kozina	142	14,9	9,0	8,9	2,9	0,21		14.10.2026
	Gorenjska		Majda	Mošnje	187	14,0	9,9	12,0	5,4	0,13		14.10.2026
	Gorenjska	star, nenamakan	Braeburn	Mošnje	164	10,9	9,2	7	4,0	0,21		13. 10. 2026

OPOMBE:

Če plodovi še niso dovolj obarvani (na primer Fuji, Braeburn), se lahko z obiranjem nekoliko počaka, vendar z obarvanostjo ne smemo čakati predolgo. Pri tem moramo spremljati, da škrobna vrednost ne preseže 8, hkrati pa moramo biti pozorni na trdoto plodov, da ta ne pade pod vrednosti, ki so določene za posamezno sorto. Predolgo čakanje na doseganje ustrezne obarvanosti lahko namreč privede do zmanjšane skladiščne sposobnosti plodov, zato je priporočljivo večkratno oziroma postopno obiranje. Plodovi z nižjo trdoto so primernejši za takojšnjo prodajo in neposredno uživanje.

Bodite pozorni na pojav steklavosti, napravite prereze jabolk.

Kjer so kisline zelo visoke (nad 7 g/L) naj plodovi ne gredo v takojšnjo prodajo končnemu potrošniku.

METODE DELA: Preglednica je plod sodelovanja Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) in Javne službe v sadjarstvu (JSsad).

Vzorčenja jabolk na določenih lokacijah v Sloveniji opravijo svetovalci JSKS z različnih območnih enot KGZS, analiza plodov se opravi na Sadjarskem centru Maribor v Gačniku na aparatu Pimprenelle obiralno okno za posamezno sorto pa se določi v panelni diskusiji svetovalcev JSKS in predstavnikov JSsad. Panelni diskusiji se pridruži tudi strokovnjak z Oddelka za živilsko tehnologijo BF UL in FKBV UM.